

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО СПИДУ 2019

ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ВИЧ ЗА 2018 ГОД

Общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляло 37,9 [32,7–44,0] млн человек.

23,3 [20,5–24,3] млн людей получали лечение в рамках антиретровирусной терапии.

Число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,7 [1,4–2,3] млн.

Число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составило 770 000 [570 000–1,1 млн] человек.

74,9 [58,3–98,1] млн человек заразились ВИЧ с начала эпидемии.

32,0 [23,6–43,8] млн человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней с начала эпидемии.

Люди, живущие с ВИЧ

- В 2018 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 37,9 [32,7–44,0] млн человек:
 - 36,2 [31,3–42,0] млн взрослых
 - 1,7 [1,3–2,2] млн детей (в возрасте до 15 лет)
- В 2018 г. 79% [67–92%] всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.
- Около 8,1 млн людей не знали о том, что они живут с ВИЧ.

Люди, живущие с ВИЧ и получающие лечение в рамках антиретровирусной терапии

- В 2018 году доступ к антиретровирусной терапии имели 23,3 миллиона [20,5—24,3 миллиона] человек, живущих с ВИЧ, по сравнению с 7,7 миллиона [6,8—8,0 миллиона] в 2010 году.
- 62% [47–74%] всех людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению.
 - 62% [47–75%] взрослых в возрасте 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, и 54% [37–73%] детей в возрасте 0–14 лет имели доступ к лечению.
 - 68% [52–82%] взрослых женщин в возрасте 15 лет и старше имели доступ к лечению, в то время как только 55% [41–68%] взрослых мужчин в возрасте 15 лет и старше имели доступ.
- В 2018 году 82% [62– >95%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению с применением антиретровирусных препаратов с целью предотвращения передачи вируса плоду.

Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией

- Число новых случаев заражения ВИЧ сократилось на 40% по сравнению с 1997 годом, когда этот показатель достиг пикового значения.

- В 2018 году число новых случаев заражения ВИЧ снизилось до 1,7 [1,4–2,3] млн по сравнению с 2,9 [2,3–3,8] млн в 1996 году.
- В 2018 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, по оценкам, снизился на 16% относительно 2010 года, с 2,1 [1,6–2,7] млн до 1,7 [1,4–2,3] млн.
- В 2018 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей снизился на 41% относительно 2010 года, с 280 000 [190 000–430 000] до 160 000 [110 000–260 000].

Смертность вследствие СПИДа

- Показатель смертности вследствие СПИДа снизился на 55% относительно пикового показателя 2004 года.
- В 2018 году общемировое число умерших от сопутствующих СПИДу болезней составило 770 000 [570 000–1,1 млн] человек. Для сравнения в 2004 году этот показатель составлял 1,7 [1,3–2,4] млн человек и 1,2 [860 000–1,6] млн человек в 2010 году.

90–90–90

- В 2018 году 79% [67%–92%] людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.
- 78% [69%–82%] людей, знающих свой статус, имели доступ к лечению.
- Супрессия вирусной нагрузки наблюдалась у 86% [72%–92%] людей, пользующихся доступом к лечению.
- В 2018 году из всех людей, живущих с ВИЧ, 79% [67–92%] знали свой статус, 62% [47–74%] имели доступ к лечению и 53% [43–63%] достигли супрессии вирусной нагрузки.

Женщины

- Каждую неделю ВИЧ заражаются около 6200 молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет.
- В Тропической Африке четыре из пяти новых случаев инфицирования среди подростков в возрасте 15–19 лет отмечаются у девушек. Вероятность наличия ВИЧ у молодых женщин в возрасте 15–24 лет в два раза выше, чем у мужчин.
- Более одной трети (35%) женщин по всему миру подвергались физическому и/или сексуальному насилию в некоторые периоды своей жизни.
- В некоторых регионах вероятность заражения ВИЧ в полтора раза выше у женщин, подвергавшихся физическому или сексуальному насилию со стороны своего партнера, чем у женщин, в отношении которых такого насилия не совершалось.

Ключевые группы риска

- На ключевые группы риска и их сексуальных партнеров приходится:
 - 54% новых случаев заражения ВИЧ по всему миру.

- Более 95% новых случаев заражения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.
- 95% новых случаев заражения ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
- 88% новых случаев заражения ВИЧ в Западной и Центральной Европе, а также в Северной Америке.
- 78% новых случаев заражения ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- 65% новых случаев заражения ВИЧ в Латинской Америке.
- 64% новых случаев заражения ВИЧ в Западной и Центральной Африке.
- 47% новых случаев заражения ВИЧ в странах Карибского бассейна.
- 25% новых случаев заражения ВИЧ в Восточной и Южной Африке.
- Риск заражения ВИЧ:
 - в 22 раз выше среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами;
 - в 22 раза выше среди потребителей инъекционных наркотиков;
 - в 21 раз выше среди лиц, работающих в секс-индустрии;
 - в 12 раз выше среди трансгендерных лиц.

ВИЧ/Туберкулез

- Туберкулез является основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, на него приходится около одной трети случаев смерти, связанных со СПИДом.
- В 2017 году приблизительно у 10 миллионов [9,0—11,1 миллиона] человек развился туберкулез, примерно 9% из них жили с ВИЧ.
 - Люди, живущие с ВИЧ, не имеющие симптомов туберкулеза, нуждаются в профилактической терапии заболевания. Это уменьшает риск развития туберкулеза и сокращает смертность от туберкулеза/ВИЧ примерно на 40%.
- По оценочным данным 49% людей, живущих с ВИЧ и туберкулезом, не знают о своей коинфекции и поэтому не получают лечения.

Инвестиции

- По состоянию на конец 2018 года было выделено 19,0 млрд долл. США на борьбу со СПИДом в странах с низким и средним уровнями дохода.
 - Около 56% от общих ресурсов, выделенных на борьбу с ВИЧ в странах с низким и средним уровнями дохода в 2018 году, было получено из внутренних источников.
- По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на борьбу со СПИДом потребуется 26,2 млрд долл. США.

Глобальные данные по ВИЧ

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2018
Люди, живущие с ВИЧ	24.9 млн [21.5 млн– 28.9 млн]	28.5 млн [24.5 млн– 33.0 млн]	31.7 млн [27.3 млн– 36.8 млн]	33.2 млн [28.7 млн– 38.6 млн]	34.8 млн [30.0 млн– 40.4 млн]	35.6 млн [30.7 млн– 41.3 млн]	36.4 млн [31.4 млн– 42.3 млн]	37.2 млн [32.1 млн– 43.2 млн]	37.9 млн [32.7 млн– 44.0 млн]
Новые случаи заражения ВИЧ (всего)	2.8 млн [2.2млн– 3.6 млн]	2.4 млн [1.9 млн– 3.2 млн]	2.1 млн [1.6 млн– 2.7 млн]	2.0 млн [1.5 млн– 2.6 млн]	1.9 млн [1.5 млн– 2.5 млн]	1.9 млн [1.5 млн– 2.4 млн]	1.8 млн [1.4 млн– 2.4 млн]	1.8 млн [1.4 млн– 2.3 млн]	1.7 млн [1.4 млн– 2.3 млн]
Новые случаи заражения ВИЧ (в возрасте 15+)	2.3 млн [1.8 млн– 3.1 млн]	2.0 млн [1.6 млн– 2.6 млн]	1.8 млн [1.4 млн– 2.4 млн]	1.8 млн [1.4 млн– 2.3 млн]	1.7 млн [1.3 млн– 2.2 млн]	1.7 млн [1.3 млн– 2.2 млн]	1.7 млн [1.3 млн– 2.2 млн]	1.6 млн [1.3 млн– 2.1 млн]	1.6 млн [1.2 млн– 2.1 млн]
Новые случаи заражения ВИЧ (в возрасте 0–14)	450 000 [300 000– 700 000]	410 000 [270 000– 640 000]	280 000 [190 000– 430 000]	230 000 [150 000– 350 000]	200 000 [130 000– 310 000]	190 000 [120 000– 290 000]	180 000 [120 000– 280 000]	170 000 [110 000– 270 000]	160 000 [110 000– 260 000]
Смертность вследствие СПИДа	1.4 млн [1.0 млн– 1.9 млн]	1.7 млн [1.3 млн– 2.3 млн]	1.2 млн [860 000– 1.6 млн]	1.0 млн [770 000– 1.4 млн]	920 000 [680 000– 1.3 млн]	880 000 [650 000– 1.2 млн]	840 000 [620 000– 1.1 млн]	800 000 [600 000– 1.1 млн]	770 000 [570 000– 1.1 млн]
Люди, получающие антиретровирусную терапию	576 000 [507 000– 599 000]	2.0 млн [1.8 млн– 2.1 млн]	7.7 млн [6.8 млн– 8.0 млн]	11.2 млн [9.9 млн– 11.7 млн]	15.1 млн [13.3 млн– 15.7 млн]	17.0 млн [15.0 млн– 17.7 млн]	19.1 млн [16.8 млн– 19.9 млн]	21.3 млн [18.8 млн– 22.2 млн]	23.3 млн [20.5 млн– 24.3 млн]
Ресурсы, выделенные на борьбу с ВИЧ (в странах с низким и средним уровнями дохода)*	4.8 млрд долл. США**	9.4 млрд долл. США**	15.0 млрд долл. США**	17.4 млрд долл. США**	18.1 млрд долл. США***	18.0 млрд долл. США***	18.4 млрд долл. США***	19.9 млрд долл. США***	19.0 млрд долл. США***

* Постоянных долларов 2016 г.

** Страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2012 года.

*** Страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2013 года.

Региональные данные за 2018 г.

Регион	Люди, живущие с ВИЧ 2018 г.	Новые случаи заражения ВИЧ, 2018 г.			Смертность вследствие СПИДа 2018 г.	Люди, получающие антиретровирусную терапию 2018 г.
		Total	Aged 15+	Aged 0–14		
Страны Восточной и Южной Африки	20.6 млн [18.2 млн–23.2 млн]	800 000 [620 000–1.0 млн]	710 000 [550 000–940 000]	84 000 [57 000–140 000]	310 000 [230 000–400 000]	13.8 млн [12.1 млн–14.3 млн]
Азиатско-Тихоокеанский регион	5.9 млн [5.1 млн–7.1 млн]	310 000 [270 000–380 000]	300 000 [260 000–360 000]	12 000 [9800–18 000]	200 000 [160 000–290 000]	3.2 млн [2.8 млн–3.3 млн]
Западная и Центральная Африка	5.0 млн [4.0 млн–6.3 млн]	280 000 [180 000–420 000]	220 000 [140 000–340 000]	58 000 [36 000–87 000]	160 000 [110 000–230 000]	2.6 млн [2.2 млн–2.7 млн]
Латинская Америка	1.9 млн [1.6 млн–2.4 млн]	100 000 [79 000–130 000]	100 000 [77 000–130 000]	3100 [2100–4600]	35 000 [25 000–46 000]	1.2 млн [1.1 млн–1.3 млн]
Карибский бассейн	340 000 [290 000–390 000]	16 000 [11 000–24 000]	15 000 [10 000–22 000]	1100 [660–1500]	6700 [5100–9100]	187 000 [164 000–194 000]
Ближний Восток и Северная Африка	240 000 [160 000–390 000]	20 000 [8500–40 000]	18 000 [7700–37 000]	1500 [710–2 800]	8400 [4800–14 000]	78 800 [69 400–82 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	1.7 млн [1.5 млн–1.9 млн]	150 000 [140 000–160 000]	150 000 [130 000–160 000]	—*	38 000 [28 000–48 000]	648 000 [571 000–674 000]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	2.2 млн [1.9 млн–2.4 млн]	68 000 [58 000–77 000]	68 000 [58 000–77 000]	—*	13 000 [9400–16 000]	1.7 млн [1.5 млн–1.8 млн]
Общемировые показатели	37.9 млн [32.7 млн–44.0 млн]	1.7 млн [1.4 млн–2.3 млн]	1.6 млн [1.2 млн–2.1 млн]	160 000 [110 000–260 000]	770 000 [570 000–1.1 млн]	23.3 млн [20.5 млн–24.3 млн]

* Оценочные данные о детях не публикуются из-за их небольшого числа.

Региональная антиретровирусная терапия в 2018 году

Контактная информация

	Процент беременных женщин, получающих антиретровирусные препараты для предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку	Процент взрослых (старше 15 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	Процент детей (в возрасте 0—14 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	Процент всех людей, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию (всего)
Страны Восточной и Южной Африки	92% [69—95%]	67% [52—78%]	62% [42—82%]	67% [52—78%]
Азиатско-Тихоокеанский регион	56% [47—71%]	54% [41—68%]	78% [57—95%]	54% [41—68%]
Западная и Центральная Африка	59% [42—78%]	53% [37—69%]	28% [18—39%]	51% [36—66%]
Латинская Америка	76% [61—95%]	63% [44—79%]	48% [34—64%]	62% [44—78%]
Карибский бассейн	86% [68—95%]	56% [42—68%]	42% [29—51%]	55% [42—67%]
Ближний Восток и Северная Африка	28% [16—47%]	32% [18—54%]	35% [21—53%]	32% [18—54%]
Восточная Европа и Центральная Азия	—*	37% [30—43%]	—*	38% [30—44%]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	—*	79% [61—92%]	—*	79% [61—92%]
По всему миру	82% [62—95%]	62% [47—75%]	54% [37—73%]	62% [47—74%]

Отдел по глобальной информационно-просветительской и коммуникационной работе | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

Дополнительная информация доступна по адресу: aidsinfo.unaids.org

* Оценочные данные о детях не публикуются из-за их небольшого числа.